1789
Lue 2 fois

n°. 20. ~~bis~~

Observation Sur une fracture du Col du femur

Les fractures du Col du femur ont été pendant Longtems L'objet de L'attention de L'académie, afin de déterminer par des Signes qui Lui Sont propres cette Espece de fracture, En constater L'Existence, Et La distinguer de la Luxation de La Cuisse: Les mémoires de M. Joubert Et Sabatier ne Laissent rien à desirer à ce Sujet. Les differentes observations qui ont Eté communiquées à L'academie Sur cette maladie ont presque toutes fait Voir que cette fracture ne Se guérissoit rarement ~~jamais~~, puisque par L'ouverture des cadavres faite plusieurs années après L'accident, Les parties du Col fracturé Se Sont trouvées désunies comme Le premier jour: Cependant il paroit qu'on ne peut pas nier la possibilité de la réünion dans cette fracture; M. Berdolin En a fourni un Exemple consigné dans les mémoires de L'académie; j'ai moi-même présenté à L'académie, il y a plusieurs années, une portion d'un femur dont Le Col qui avoit été fracturé, paroit Solidement réuni; La piece que j'ai L'honneur de présenter aujourd'hui En fournit une Nouvelle preuve.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 31 d 3 n° 71

Une femme agé de 84 ans, En descendant Les marches d'une Chapelle de S.t Sulpice, au mois d'Octobre dernier, tomba Sur Le coté gauche Et ne put Se relever: Elle fut transportée chés Elle, Et y ayant Eté appellé, je Soupçonnai à L'inspection qu'il y avoit une fracture du Col du femur; Le membre Etoit racourci d'Environ un pouce Et Le pied considérablement tourné En dehors; La malade Sentoit beaucoup de douleurs dans le lieu de la fracture; mais il n'y avoit aucun gonflement: Dans cet Etat je procédai à la réduction de la fracture, Et en faisant maintenir Le membre dans La rectitude Et la Longueur qu'il devoit avoir, je le plaçai dans les fanons, ayant Soin que le coté Externe montât Le plus haut possible Et fut Contenu par une Serviette passée autour du Corps: j'avois attention chaque jour de redresser Le pied qui tendoit toujours à Se porter en dehors. Pendant Le cours de Son traitement la malade n'a Eprouvé aucun accident; Et après l'avoir tenue pendant deux mois Et demi dans Les Liens, je les lui otai. La foiblesse dans laquelle Elle etoit alors ne permit pas de la faire Sortir de Son Lit: Le membre Se trouva à peu près de la même Longueur que L'autre Et il ne lui restoit pour toute gene qu'un défaut

de Souplesse dans l'articulation du genou, causé par la roideur des Ligamens qui n'avoient Soufferts aucun mouvement pendant tout le tems de la cure, mais qui devinrent plus Souples par les mouvemens qu'on faisoit faire Souvent à la jambe Sur L'os de la Cuisse. Cette malade Etoit depuis Longtems Sujette à des Etouffemens qui ont mis plusieurs fois Sa vie en danger; Ces mêmes Etouffemens Se Sont renouvellés avec Violence à la fin du grand froid de L'hiver dernier, accompagnés de foiblesses fréquentes; Ses forces ont diminuées peu à peu Et Elle est morte au commencemt. du mois de Mars dernier.

Cet Evenement me détermina à Examiner L'Etat dans lequel je trouverois les parties qui avoient Eté fracturées: je Sciai Le femur à 3 ou 4 pouces audessous de Son Col; j'Exécutai la même chose à L'os des isles Et j'Emportai le tout en conservant la tête du femur dans la Cavité cotiloïde: C'est dans cet Etat que je L'ai présenté dernierement à l'académie: Le Col du femur m'a paru avoir Eté fracturé vers Sa base tenant à L'os; mais la Consolidation etoit complette dans toute l'étendue où la réunion a pu S'opérer; La tête Etoit déprimée du côté interne, Et du Coté Externe Elle a Laissé un Ecartement où la réunion n'a pu Se faire: Le grand Trocanter a été aussi fracturé entierement Et ne S'est

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

point réuni. Cette observation prouve que, quoique le plus souvent la réunion ne se fait pas dans cette Espece de fracture, Cependant il est des cas où Elle a Lieu quelquefois.

Leme